

CHASQUE AQUÍ PARA SALTAR PARA UTILIZAR DIRECCIONES

The following Spanish-language translation of the EPA-registered label for TRIMEC CLASSIC, EPA Reg. No. 2217-543, is provided as a convenience and is not intended as a replacement of or substitute for the actual English-language text of the label approved for use by the EPA. All users must follow label directions as set forth on the product's English-language label, and PBI/GORDON EXPRESSLY DISCLAIMS ANY LIABILITY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LIABILITY FOR PERSONAL INJURIES OR DEATH OR FOR PROPERTY DAMAGE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ENVIRONMENTAL INJURY), ARISING OUT OF OR RESULTING FROM ANY ACTUAL OR APPARENT DISCREPANCIES BETWEEN THE ENGLISH TEXT OF THE PRODUCT'S LABEL AND THE FOLLOWING TRANSLATION.

La siguiente traducción al español del etiquetado aprobado por la EPA para TRIMEC CLASSIC, N° Reg. EPA 2217-543, se proporciona como etiquetado suplementario. Esta etiqueta de muestra no tiene como fin reemplazar o sustituir la etiqueta del envase. Todos los usuarios deben seguir las instrucciones en la etiqueta tal como se manifiesta en la etiqueta en inglés del producto, y PBI/GORDON DECLARA DENEGAR EXPRESAMENTE TODA RESPONSABILIDAD POR, INCLUIDA PERO SIN ESTAR LIMITADA A ELLA, LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O MUERTE O DAÑO FÍSICO (INCLUIDO PERO SIN ESTAR LIMITADO A ELLO CUALQUIER PERJUICIO AMBIENTAL), QUE SURJA O RESULTE DE CUALQUIER DISCREPANCIA REAL O APARENTE ENTRE LA VERSION INGLESA DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y LA TRADUCCION SIGUIENTE.



TRIMEC CLASSIC BRAND

HERBICIDA CONTRA MALEZAS DE HOJA ANCHA

USE ESTE PRODUCTO SOLAMENTE DE CONFORMIDAD CON SU ETIQUETADO Y CON LA NORMA DE PROTECCION DEL TRABAJADOR, 40 CFR PARTE 170.

¡Fórmula de poco olor!
Control excepcional de las malezas de hoja ancha.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Sal dimetilamina del ácido 2,4-diclorofenoxiacético	25.93%
Sal dimetilamina del ácido (+)-(R)-2-(2-metil-4-clorofenoxi) propiónico	6.93%
Sal dimetilamina de dicamba: Acido 3,6-dicloro-o-anísico	2.76%
INGREDIENTES INERTES:	64.38%
TOTAL	100.00%

ESTE PRODUCTO CONTIENE:

Equivalente de 1.98 lb de ácido 2,4-dicloropropoxiacético por galón ó 21.54%

Equivalente de 0.53 lb de ácido (+)-R-2-(2-metil-4-cloropropoxi) propiónico por galón ó 5.73%

Equivalente de 0.21 lb de ácido 3,6-dicloro-o-anísico por galón ó 2.29%

Análisis específico de isómeros mediante el método de la AOAC (Asociación de Químicos Analíticos Oficiales).

Contiene la forma de isómero simple de Mecoprop-p.

TRIMEC® es una marca registrada de PBI/GORDON CORPORATION.



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS DANGER – PELIGRO

Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle. (If you do not understand the label, find someone to explain it to you in detail).

Vea más abajo las medidas de primeros auxilios y otras declaraciones precautorias.



LEA LA ETIQUETA COMPLETA PRIMERO.
RESPETE TODAS LAS MEDIDAS DE PRECAUCION Y SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.

DECLARACIONES PRECAUTORIAS

Peligros para los humanos y animales domésticos

PELIGRO: Corrosivo. Causa daño irreversible a los ojos. Causa irritación de la piel. No se salpique los ojos, la piel o la ropa. Nocivo si se ingiere o inhala. Evite estar expuesto a la niebla de pulverización.

USOS NO CUBIERTOS POR LA WPS:

A continuación damos una lista de algunos de los materiales que son resistentes a las sustancias químicas de este producto. En caso de querer más opciones, siga las instrucciones para la categoría A en una tabla de selección de categorías de quimiorresistencia de la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente). Los aplicadores y otras personas que manipulan este pesticida para cualquier uso NO amparado por la Norma de Protección del Trabajador (WPS por sus siglas en inglés) (40 CFR Parte 170) - en general, solamente los usos en vegetación y agricultura están cubiertos por la WPS - deben usar lo siguiente:

- Careta de protección o gafas al realizar operaciones de mezcla, carga o aplicación de este producto. Durante la mezcla, carga o aplicación de este producto, use camisa de mangas largas, pantalones largos, calcetines, zapatos, guantes resistentes a productos químicos hechos de material tal como laminado-barrera, caucho butilo, caucho nitrilo o Viton y protección de los ojos. Es recomendable que los anteojos de seguridad incluyan protección de la frente, las cejas y las sienas.

Después de usar este producto, enjuague los guantes antes de quitárselos, después quítese la roja y lávela separadamente antes de volverla a usar. Lávese cuanto antes las manos y la piel cuidadosamente con jabón y agua. Quítese la ropa saturada tan pronto como sea posible y dúchese.

Declaraciones sobre control técnico para los usos no cubiertos por la WPS:

Envases de más de 1 galón y menos de 5 galones: Las personas que realizan el vertido abierto de este producto también deben usar mono o un delantal resistente a productos químicos.

Envases de 5 galones o más: No vierta el producto directamente de este envase. Deberá utilizar un sistema mecánico (por ejemplo, una lanza y bomba o espiche) para el trasiego del contenido de este envase. Si vacía el contenido de un envase de pesticida desechable, enjuague la lanza antes de retirarla.

USOS CUBIERTOS POR LA WPS:

A continuación damos una lista de algunos de los materiales que son resistentes a las sustancias químicas de este producto. En caso de querer más opciones, siga las instrucciones para la categoría A en una tabla de selección de categorías de quimiorresistencia de la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente). Los aplicadores y otras personas que manipulan este pesticida para cualquier uso amparado por la Norma de Protección del Trabajador (WPS por sus siglas en inglés) (40 CFR Parte 170) - en general, solamente los usos en vegetación y agricultura están cubiertos por la WPS - deben usar lo siguiente:

- Mono encima de una camisa de mangas cortas y pantalones cortos.
- Guantes quimiorresistentes hechos de material tal como laminado-barrera, caucho butilo, caucho nitrilo o Viton.
- Calzado quimiorresistente y calcetines.
- Anteojos protectores.

Siga las instrucciones del fabricante relativas a la limpieza y mantenimiento del equipo protector personal. En caso de no tener tales instrucciones para los componentes lavables, use detergente y agua caliente. Mantenga y lave el equipo protector personal separado de otra ropa para lavar. Después de cada día de uso, no vuelva a usar la ropa o equipo protector personal hasta haberlo lavado.

Declaraciones sobre control técnico para los usos cubiertos por la WPS:

Envases de más de 1 galón y menos de 5 galones: El personal encargado de realizar las operaciones de mezcla y carga del producto sin utilizar un sistema mecánico (lanza y bomba) para el trasiego del contenido de este envase deberá usar mono o un delantal resistente a productos químicos, además del otro equipo protector personal requerido.

Envases de 5 galones o más: No vierta el producto directamente de este envase. Deberá utilizar un sistema mecánico (por ejemplo, una lanza y bomba o espiche) para el trasiego del contenido de este envase. Si vacía el contenido de un envase de pesticida desechable, enjuague la lanza antes de retirarla. Si utiliza el sistema mecánico de conformidad con

los requisitos descritos en la Norma de Protección del Trabajador (WPS) relativos a los pesticidas agrícolas [40 CFR 170.240(d)(4)], es posible reducir o modificar los requisitos relativos al equipo protector personal del manipulador, según lo especificado en la WPS.

Cuando los manipuladores de este producto utilizan sistemas cerrados o cabinas cerradas de conformidad con los requisitos estipulados en la Norma de Protección del Trabajador (WPS) relativos a los pesticidas agrícolas [40 CFR 170.240(d)(4-6)], es posible reducir o modificar los requisitos relativos al equipo protector personal del manipulador, según lo especificado en la WPS.

Recomendaciones de seguridad para el usuario:

- Los usuarios deben lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar los servicios higiénicos.
- Los usuarios deben quitarse la ropa inmediatamente si el pesticida la traspasa. En ese caso, lávese cuidadosamente y póngase ropa limpia.
- Los usuarios deben quitarse el equipo protector personal inmediatamente después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lávese, tan pronto como sea posible, y póngase ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos:	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga abierto el ojo y enjuague lenta y suavemente con agua por 15 a 20 minutos. • Quítense los lentes de contacto, si los tuviera, después de los primeros 5 minutos, y continúe enjuagando el ojo. • Llame a un centro de consultas toxicológicas o un médico respecto al tratamiento adecuado.
En caso de contacto con la piel o la ropa:	<ul style="list-style-type: none"> • Quítense la ropa contaminada. • Enjuáguese inmediatamente la piel con agua abundante por 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de consultas toxicológicas o un médico respecto al tratamiento adecuado.
En caso de ingestión:	<ul style="list-style-type: none"> • Llame inmediatamente a un centro de consultas toxicológicas o un médico para solicitar consejos sobre el tratamiento. • Si la persona puede tragar, debe beber lentamente un vaso de agua. • No induzca el vómito salvo que un centro de consultas toxicológicas o un médico indique al contrario. • No dé nada por vía bucal a una persona que está inconsciente.
En caso de inhalación:	<ul style="list-style-type: none"> • Traslade a la persona al aire fresco. • Si la persona no está respirando, llame al 911 ó a un servicio de ambulancia, y aplíquele respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible. • Llame a un centro de consultas toxicológicas o un médico respecto al tratamiento adecuado.
<p>Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al centro de consultas toxicológicas o médico o se dirige a un lugar de atención médica.</p> <p>Aviso para el médico: El probable daño de las mucosas puede contraindicar el uso de un lavado gástrico.</p>	

PELIGROS AMBIENTALES:

Este producto es tóxico para los invertebrados acuáticos. La deriva o el escurrimiento puede afectar perjudicialmente a los invertebrados acuáticos y a las plantas selectivas. No aplique el producto directamente al agua, o a zonas donde haya presencia de agua superficial, o a las zonas intermareales por debajo de la marca de pleamar media. No contamine el agua al desechar el agua de lavado del equipo. No contamine las aguas de irrigación o potable. No aplique el producto cuando las condiciones climáticas favorecen la deriva desde la zona a ser tratada.

Durante la limpieza del equipo, no vierta el agua de lavado al suelo; rocíe o vacíe sobre una área extensa lejos de pozos y otras fuentes de agua.

La mayoría de los casos de contaminación de las napas freáticas con herbicidas de fenoxi, por ejemplo, 2,4-D y MCPP-p, han sido asociados con los lugares de mezcla, carga y eliminación. Proceda con cautela cuando manipule los pesticidas 2,4-D y MCPP-p en lugares como éstos, para evitar la contaminación de las napas freáticas. El uso de sistemas cerrados para mezclar o trasegar este pesticida reducirá la probabilidad

de que ocurran derrames. La colocación del equipo de mezcla y carga sobre una base impermeable para contener los derrames ayudará a impedir la contaminación de las napas freáticas.

MODO DE EMPLEO

El uso de este producto de forma contraria a lo indicado en su etiqueta constituye infracción de la ley federal.

No aplique este producto de tal manera que vaya a quedar en contacto con los trabajadores u otras personas, sea directamente o por deriva. Solamente el personal con equipo protector puede estar en la zona durante la aplicación del producto.

Para cualquier requisito específico de su estado o tribu, consulte con la agencia responsable de los reglamentos relativos a pesticidas.

REQUISITOS PARA USO AGRICOLA

Use este producto solamente de acuerdo con su etiquetado y con la Norma de Protección del Trabajador, 40 CFR Parte 170.

Esta norma contiene los requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros de plantas e invernaderos, y de los manipuladores de pesticidas agrícolas. Contiene los requisitos para la capacitación, descontaminación, notificación y ayuda de urgencia. Además, contiene las instrucciones específicas y las excepciones correspondientes a las declaraciones en esta etiqueta acerca del equipo protector personal e intervalo de entrada restringida. Los requisitos en esta caja aplican solamente a los usos de este producto cubiertos por la Norma de Protección del Trabajador.

No entre, ni permita la entrada de trabajadores, a las zonas tratadas durante el intervalo de entrada restringida (REI por sus siglas en inglés) de 48 horas.

En caso de la entrada prematura a las zonas tratadas según lo permitido por la Norma de Protección del Trabajador que comprende el contacto con cualquier cosa que haya sido tratada con el producto, tal como plantas, suelo o agua, se deberá usar: • Mono sobre camisa de mangas cortas y pantalones cortos • Guantes quimiorresistentes hechos de material tal como laminado-barrera, caucho butilo, caucho nitrilo o Viton • Calzado quimiorresistente y calcetines • Anteojos protectores.

Requisitos para el uso no agrícola

Los requisitos en esta caja aplican a los usos de este producto que NO figuran dentro del ámbito de la Norma de Protección del Trabajador para los pesticidas agrícolas (40 CFR Parte 170). La Norma de Protección del Trabajador aplica cuando este producto se usa para tratar plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos.

Declaración de reentrada: No permita que ninguna persona (aparte del aplicador) ni mascota entre a la zona de tratamiento durante la aplicación. No entre a la zona de tratamiento hasta después que el rociado se haya secado.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

No contamine el agua, los alimentos o los piensos al almacenar o eliminar el producto.

ALMACENAMIENTO: Guarde el producto en el envase original en un lugar bajo llave. Evite la congelación.

ELIMINACION DE LOS PESTICIDAS: Los residuos derivados del uso de pesticidas son gravemente peligrosos. La eliminación inadecuada del pesticida sobrante, la mezcla de pulverización o el agua proveniente del enjuague del equipo, constituye infracción de la ley federal y puede contaminar las capas freáticas. En el caso de que estos residuos no puedan eliminarse de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta, comuníquese con la agencia de control ambiental o de pesticidas de su estado o con un representante de tratamiento de residuos peligrosos en la oficina regional de la EPA, para asesoramiento.

ELIMINACION DEL ENVASE: *Para envases de plástico* - Enjuague tres veces (o equivalente). Después ofrézcalos para reciclaje o reacondicionamiento, o perforelos y elimine en un vertedero sanitario, o por incineración, o si fuese permitido por las autoridades estatales o locales, quémelos. En caso de quemarlos, aléjese del humo.

PRADOS ORNAMENTALES, CESPED ORNAMENTAL Y GRANJAS PRODUCTORAS DE CESPED EN TEPES:

MEDIDAS DE PRECAUCION PARA EL USO DEL PRODUCTO:

No aplique este producto a través de ningún tipo de sistema de irrigación. Evite la deriva de la niebla de pulverización sobre los vegetales,

las flores, las plantas ornamentales, los arbustos, los árboles y otras plantas deseables. No vierta las soluciones de pulverización cerca de plantas deseables. Utilice solamente pulverizadores para prados. Evite las pulverizaciones finas; las pulverizaciones de gota gruesa tienen menos probabilidad de derivar. No pulverice las raíces de las plantas ornamentales y de los árboles. No exceda las dosis especificadas para las zonas; preste especial atención a la línea de goteo de los árboles y otras especies ornamentales.

No haga aplicaciones al voleo cuando la temperatura ambiente sobrepasa los 85°F; se puede esperar algunos daños con los tratamientos por zonas cuando la temperatura ambiente sobrepasa los 85°F. La semilla puede sembrarse entre 3 y 4 semanas después de la aplicación. Limpie el pulverizador con jabón o detergente y enjuáguelo a fondo después de usar este producto, y antes de usarlo con otros pesticidas. Procure no hacer aplicaciones donde el escurrimiento podría contaminar las extensiones de agua, o donde la deriva de pulverización podría acarrear el producto químico a los cultivos alimentarios o a campos de pastoreo donde el ganado bovino, ovino, caprino y porcino, o incluso las aves podrían estar expuestos al producto.

LUGARES:

El Trimec® Classic Broadleaf Herbicide está diseñado para ser aplicado por jardineros y paisajistas en prados ornamentales y céspedes establecidos en lugares institucionales, ornamentales y residenciales/domésticos. • Los lugares institucionales se definen como zonas de césped alrededor de edificios o instalaciones que prestan servicio a organizaciones públicas o privadas incluidos, pero sin estar limitados a: hospitales, casas de ancianos, escuelas, museos, bibliotecas, instalaciones deportivas, campos de golf y edificios de oficinas. Los lugares ornamentales incluyen césped establecido alrededor de residencias, parques, calles, establecimientos minoristas, cementerios, edificios industriales e institucionales. Finalmente, los lugares residenciales y domésticos se definen como zonas asociadas con la familia o vida de familia incluidos, pero sin estar limitados a: complejos de apartamentos, condominios e instalaciones de atención de pacientes de casas de ancianos, instituciones psiquiátricas, hospitales u hogares de convalecencia.

Además, el Trimec® Classic Broadleaf Herbicide proporciona el control selectivo de las malezas de hoja ancha encontradas en céspedes de climas cálido y frío establecidos para la producción comercial de tepes.

PRADOS ORNAMENTALES, CESPED ORNAMENTAL Y GRANJAS PRODUCTORAS DE TEPES ESTABLECIDOS CON CESPEDES DE CLIMA FRIO Y CLIMA CALIDO:

Se obtendrá el control máximo de las malezas en los céspedes de clima frío y de clima cálido con las aplicaciones realizadas en la primavera o comienzos del otoño, cuando las malezas están en crecimiento activo. No lo use sobre carpetgrass (*Axonopus affinis*), dichondra (*Dichondra repens*), ni sobre prados o césped donde haya tréboles deseables presentes.

Evite pulverizar durante períodos prolongados de sequía o calor excesivo, salvo que disponga de irrigación adecuada. No riegue durante 24 horas después de la aplicación. No aplique el producto al césped recién sembrado hasta después del segundo o tercer corte. La semilla de hierba puede sembrarse entre 3 y 4 semanas después de la aplicación a las dosis recomendadas.

La dosis máxima de aplicación para césped es un equivalente de 1.0 lb de ácido 2,4-D por acre por aplicación por lugar. El número máximo de aplicaciones al voleo por lugar de tratamiento es 2 por año.

APLICACION GENERAL:

Hierbas de clima frío, Common Bermudagrass (Cynodon dactylon), Bahiagrass (Paspalum notatum) y Zoysiagrass (Zoysia, spp.) - Aplique de 3.25 a 4.0 pintas de producto por acre con volúmenes de pulverización de 20 a 260 galones por acre. O, aplique de 1.2 a 1.5 onzas fluidas de producto en 0.5 a 6 galones de agua por 1000 pies cuadrados. Use la dosis más alta de aplicación con volúmenes más altos de pulverización. La mejor época para controlar el trébol es en el otoño. Cuando se hace una aplicación en primavera para controlar el trébol, es recomendable aplicar una dosis de 4 pintas por acre.

APLICADORES POR GOTAS CONTROLADOS (CDA):

Hierbas de clima frío, Common Bermudagrass (Cynodon dactylon), Bahiagrass (Paspalum notatum) y Zoysiagrass (Zoysia, spp.) - Agregue 2.5 pintas de producto al contenedor Herbi y después llénelo con agua. Pulverice todo el contenido sobre 33,000 pies cuadrados. Evite recubrir o solapar los abanicos de pulverizado.

Bermudagrass (Cynodon dactylon) híbrido - Aplique de 2.0 a 4.0 pintas de producto por acre con volúmenes de pulverización de 20 a 260 galones por acre. O, aplique de 0.75 a 1.5 onzas fluidas de producto en 0.5 a 6 galones de agua por 1000 pies cuadrados. Use la dosis más alta de aplicación con volúmenes más altos de pulverización.

La tolerancia de ciertos bermudagrasses híbridos a este producto varía. Consulte con un especialista en control de malezas en el servicio de extensión agrícola local respecto a la tolerancia del césped a este producto.

Bentgrass (Agrostis), Centipedegrass (Eremochloa ophiuroides) y St. Augustinegrass (Stenotaphrum secundatum) - En el bentgrass (*Agrostis*) bien cortado y mantenido (greens de putting, campos de bocas y prados de exposiciones), aplique una dosis máxima de 1.0 onza fluida de producto por 1500 pies cuadrados, con volúmenes de 5.0 galones por 1500 pies cuadrados. No aplique cuando el césped está estresado por la sequía o las temperaturas elevadas. Use un equipo de aplicación capaz de distribuir gotas uniformes sobre toda la zona a ser pulverizada. El amarillamiento ligero del césped desaparecerá después de aproximadamente una semana. Procure no exceder la dosificación en el bentgrass (*Agrostis*) ya que podría dañarse.

Se puede esperar que el césped sufra algunos daños cuando se usa el producto sobre prados de centipedegrass (*Eremochloa ophiuroides*) o *St. Augustinegrass (Stenotaphrum secundatum)*; pulverice por zonas las malezas establecidas en este tipo de prados para evitar el daño que podría ocurrir con el tratamiento al voleo. No aplique este producto al *St. Augustinegrass (Stenotaphrum secundatum)* durante el verdeo de primavera, o sea, el período de transición entre el estado latente y el crecimiento activo. La tolerancia de los cultivos de *St. Augustinegrass (Stenotaphrum secundatum)* a este producto varía. No aplique este producto al 'Floritam' *St. Augustinegrass (Stenotaphrum secundatum)*.

- MALEZAS DE HOJA ANCHA -

Annual fleabane (*Erigeron annuus*)
 Aster, white heath (*Aster pilosus*) and white prairie (*Aster falcatus*)
 Bedstraw (*Gallium mollugo*)
 Beggarticks (*Biddens mitis*)
 Beggarweed, creeping (*Desmonium incamun DC*)
 Bindweed (*Convolvulus arvensis*)
 Birdsfoot trefoil (*Lotus corniculatus*)
 Black medic (*Medicago lupulina*)
 Broadleaf plantain (*Plantago major*)
 Buckhorn plantain (*Plantago lanceolata*)
 Bull thistle (*Cirsium vulgare*)
 Burclover (*Medicago polymorpha*)
 Burdock, common (*Arctium minus*)
 Buttercup, creeping (*Ranunculus repens*)
 Carolina geranium (*Geranium carolinianum*)
 Carpetweed (*Mollugo verticillata*)
 Chickweed, common (*Stellaria media*)
 Chicory (*Chichorium intybus*)
 Cinquefoil (*Potentilla recta*)
 Clover (*Trifolium*)
 Cocklebur (*Xanthium strumarium*)
 Compassplant (*Silphium laciniatum*)
 Curly dock (*Rumex crispus*)
 Dandelion (*Taraxacum officinale*)
 Dayflower (*Commelina communis*)
 Deadnettle (*Laminum amplexicaule*)
 Dock (*Urtica dioica*)
 Dogfennel (*Eupatorium capillifolium*)
 Dovefoot geranium (*Geranium molle*)
 English daisy (*Bellis perennis*)
 False dandelion (*spotted catsear y common catsear) (*Hypochoeris radicata*)
 Field bindweed (*morningglory y creeping jenny) (*convolvus arvensis*)
 Field madder (*Sherardia arvensis*)
 Field oxeye-daisy (*creeping oxeye) (*Chrysanthemum leucanthemum*)
 Field pennycress (*Thlaspi arvense*)
 Filaree, whitestem (*Erodium moschatum*) y redstem (*Erodium cicutarium*)
 Florida pusley (*Richardia scabia*)
 Ground ivy (*Glechoma hederacea*)
 Groundsel (*Senecio vulgaris*)
 Hairy bittercress (*Cardamine hirsuta*)
 Hawkweed (*Hieracium pratense*)
 Healall (*Prunella vulgaris*)
 Henbit (*Lamium amplexicaule*)
 Horsenettle (*Solanum carolinense*)
 Horsetweed (*Conyza canadensis*)
 Innocence (Blue-eyed Mary) (*Collinsia*)
 Jimsonweed (*Datura stramonium*)

Kochia (*Kochia scorparia*)
 Lambsquarters (*Chenopodium album*)
 Lawn burweed (*Soliva pterosperma*)
 Lespedeza, common (*Kummerowia striata*)
 Mallow, common (*Mauve sylvestre*)
 Matchweed (*Lippia nodiflora*)
 Mouseear chickweed (*Cerastium fontanum* spp. *Vulgare*)
 Mustard (*Arabidopsis Thaliana*) Nettle (Genus *Urtica*)
 Old world diamond flower (*Hedyotis corymbosa*)
 Oxalis (*yellow woodsorrel y creeping woodsorrel)
 (*oxalis florida* y *oxalis corniculata*)
 Parsley-piert (*Aphanes arvensis*)
 Pennsylvania smartweed (*Polygonum pensylvanicum*)
 Pennywort (*dollarweed) (*Hydrocotyle* spp.)
 Pepperweed (*Lipidium latifolium*)
 Pigweed (*Amaranthus retroflexus*)
 Pineappleweed (*Matricaria matricariodes*)
 Plantain (*Plantago*)
 Poison ivy (*Toxicodendron radicans*)
 Poison oak (*Rhus diversiloba*)
 Prostrate knotweed (*knotweed) (*Polygonum arenastrum*)
 Puncturevine (*Tribulus terrestris*)
 Purple cudweed (*Gnaphalium purpureum*)
 Purslane (*Portulaca oleracea* L.)
 Ragweed (*Ambrosia artemissifolia*)
 Redweed (*Melochia corchorifolia*)
 Red sorrel (*sheep sorrel) (*Rumex acetosella*)
 Roundleaf greenbriar (*Smilax rotundifolia*)
 Shepherdspurse (*Capsella bursa-pastoris*)
 Spotted spurge (*Euphorbia maculata*)
 Spurge (*Euphorbia*)
 Sunflower (*Tithonia rotundifolia*)
 Thistle (*Cirsium arvense*)
 Velvetleaf (*buttonweed) (*Abutilon theophrasti*)
 Venice mallow (*Hibiscus trionum*)
 Veronica (*corn speedwell) (*Veronica arvensis*)
 Virginia buttonweed (*Diodia virginiana*)
 Virginia-creeper (*Vitis hederacea*)
 Western salsify (*Tragopogon dubius*)
 White clover (*Dutch clover, honeysuckle clover, white trefoil y
 purplewort) (*Trifolium repens*)
 Wild carrot (*Daucus carota*)
 Wild garlic (*Allium ursinum*)
 Wild geranium (*Geranium maculatum*)
 Wild lettuce (*Lactuca virosa*)
 Wild mustard (*Brassica kaber*)
 Wild onion (*Allium validum*)
 Wild strawberry (*Fragaria* spp.)
 Yarrow (*Achillea millefolium*)
 Yellow rocket (*Barbarea vulgaris*)

*Sinónimos

GARANTIA LIMITADA Y DENEGACION DE RESPONSABILIDAD.

El fabricante garantiza solamente que la composición química de este producto cumple con la declaración de ingredientes dada en la etiqueta, y que el producto es razonablemente adecuado para el uso declarado en la etiqueta cuando se aplica de acuerdo a lo indicado en las instrucciones de empleo.

EL FABRICANTE NI CONCEDE NI TIENE INTENCIONES DE CONCEDER NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTIA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, LAS QUE SON EXPRESAMENTE DENEGADAS. Esta garantía limitada no cubre el uso del producto de una forma contraria a las instrucciones, advertencias o precauciones en la etiqueta, o el uso del producto bajo condiciones anormales tales como sequía, lluvia excesiva, tornados, huracanes, etc. Estos factores son ajenos al control del fabricante o del vendedor. Todo daño que surja del incumplimiento de la garantía del fabricante estará limitado a los daños directos, y no incluirá los daños indirectos o consiguientes tales como el lucro cesante o pérdida financiera, salvo que la ley estipulase al contrario.

Los términos de esta garantía limitada y denegación de responsabilidad no pueden ser modificados por ninguna declaración o convenio escrito o verbal. Ningún empleado o agente del vendedor está autorizado para modificar o exceder de ninguna manera los términos de esta garantía limitada y denegación de responsabilidad.

Los términos de esta garantía limitada y denegación de responsabilidad no pueden ser modificados por ninguna declaración o convenio escrito o verbal. Ningún empleado o agente del vendedor está autorizado para modificar o exceder de ninguna manera los términos de esta garantía limitada y denegación de responsabilidad.

881 AP100704
 N° REG. EPA 2217-543

Fabricado por
 **pbi/gordon**
CORPORATION
 Una compañía propiedad de empleados
 1217 West 12th Street
 Kansas City, Missouri 64101
www.pbigordon.com

ETIQUETAS DEL
 ESPÉCIMEN